

NOTICE

FLUIDIBRONC[®] Sirop *Carbocistéine*

COMPOSITION

*** Sirop Adultes :**

Carbocistéine.....5 g
Excipients q.s.p.....100 ml
Excipient à effet notoire : saccharose

*** Sirop Enfants :**

Carbocistéine.....2 g
Excipients q.s.p.....100 ml
Excipient à effet notoire : saccharose

INDICATIONS

Traitement des troubles de la sécrétion bronchique, notamment au cours des affections bronchiques aiguës : bronchite aiguë et épisodes aigus des bronchopneumopathies chroniques.

CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité à l'un des constituants
- Enfant de moins de 15 ans (Sirop Adultes)
- Enfant de moins de 2 ans (Sirop Enfants)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser avec précaution en cas d'ulcère gastro- duodéal.
- En raison de la présence de saccharose, ces médicaments sont contre-indiqués en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.
- En cas de diabète ou de régime hypoglucidique, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sucre : 2 g pour 5 ml de sirop Fluidibronc[®] Adultes et 3,5 g pour 5 ml de sirop Fluidibronc[®] Enfants.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Il est déconseillé d'utiliser ces médicaments en cas de grossesse et allaitement.

EFFETS INDESIRABLES

Possibilité de phénomènes d'intolérance digestive (gastralgies, nausées, diarrhées) : il est alors conseillé de réduire la dose.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

L'association avec des antitussifs et des substances asséchant les sécrétions est déconseillée.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

*** Sirop Enfants :**

- 2 à 5 ans : 1 cuillère à café, 2 fois par jour ;
- plus de 5 ans : 1 cuillère à café, 3 fois par jour.

*** Sirop Adultes :** 3 cuillères à soupe par jour.

FORME ET PRESENTATION

Sirop Adultes : Flacon en polyéthylène de 250 ml.

Sirop Enfants : Flacon en verre de 125 ml.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conserver à une température inférieure à 25°C.

Vente libre

Fluidibronc[®] Adultes
Fluidibronc[®] Enfants

AMM : n° E-2005-215
AMM : n° E-2005-216

Laboratoires OLEA

25 B.P. 276 ABIDJAN 25